PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PROCESSO SELETIVO EDITAL 079/2024-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

QUESTÃO 1 - A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Em seu capítulo II estabelece os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS). Baseado no capítulo II da referida Lei, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) A Universalidade é um dos princípios do SUS e garante o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
B) É direito da pessoa assistida o acesso à informação sobre sua situação de saúde.
C) As informações epidemiológicas devem ser utilizadas somente para a orientação programática.
D) A gestão do SUS deve se dar de forma descentralizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo.

QUESTÃO 2 - A Política Nacional de Humanização (PNH), define que o Acolhimento implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, e, quando for o caso, orientar o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, estabelecendo articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2003). A Classificação de Risco faz parte dessa política de atendimento. Neste contexto é correto afirmar:

A) É realizada por todos os profissionais da unidade de saúde, sendo desnecessários protocolos técnicos para identificar os pacientes com potencial de risco, agravo a saúde ou o grau de sofrimento.
B) Mudança na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada (burocrática).
C) As cores significam a prioridade no atendimento, sendo vermelho: Urgência; Amarelo: Emergência; Verdes: Não urgência e Azul: Condições agudas.
D) Todas as anteriores estão corretas.

QUESTÃO 3 - As ações de educação em saúde constituem-se na essência da Promoção da Saúde. Considerando esta afirmação, as alternativas abaixo citam ações consideradas de Promoção da Saúde, **EXCETO**:

A) Reunião com grupos de idosos.
B) Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
C) Distribuição de medicamentos.
D) Orientação à gestante quanto à amamentação.

QUESTÃO 4 - No que se refere ao Código De Ética dos profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo:

I. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
II. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por período superior a 29 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem (COREN), jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
III. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
IV. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.
V. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são: advertência verbal; multa, censura, suspensão do direito do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta **CORRETA**:

A) Somente I, II e III estão corretas
B) Somente I, III, IV e V estão corretas
C) Somente II e V estão corretas
D) Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 5- O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (Coren), são entidades autônomas de interesse público O COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. De acordo com o código do exercício profissional de Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro **EXCETO**:

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
C) Prescrição da assistência de enfermagem.
D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

QUESTÃO 6- O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 726 de 15 de setembro de 2023. A Resolução COFEN nº 736 de 17 de Janeiro de 2024, dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Analise as questões abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, Protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base.
( ) Os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e ações/atividades de enfermagem podem ser apoiadas nos Sistemas de Linguagem Padronizada de Enfermagem, em protocolos institucionais, e com os melhores níveis de evidências científicas.
( ) Planejamento de Enfermagem – compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
( ) Os profissionais de enfermagem bem como as instituições de saúde devem buscar os meios necessários para a capacitação/qualificação na utilização do Processo de Enfermagem.

Assinale a sequência **CORRETA**:

A) V, F, V, F
B) V, F, V, V
C) V, V, V, V
D) V, F, F, V

QUESTÃO 7 – A Resolução 736/2024 Art. 4º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, descritas abaixo. Assim, correlacione as colunas e marque a alternativa **CORRETA:**

(I) Avaliação de Enfermagem	( ) Determinação de resultados (quantitativos e/ou qualitativos) esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde
(II) Diagnóstico de Enfermagem	( ) Padrões de cuidados em Programas de Saúde: cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares
(III) Planejamento de Enfermagem	( ) compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.
(IV) Implementação de Enfermagem	( ) compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática

(V) Evolução de Enfermagem	( ) compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais.

Assinale a sequência **CORRETA**:

A) III, IV, V, II, I
B) III, IV, V, I, II
C) III, V, IV, II, I
D) IV, III, I, V, II

QUESTÃO 8 – A região abdominal é complexa por abrigar órgãos vitais. A avaliação semiológica abdominal é fundamental para identificar condições clínicas, que podem ser benignas ou graves. Uma das etapas do exame físico do abdome, é a palpação. Assinale a alternativa que contém os dois momentos da palpação abdominal.

A) Lateral e transversal
B) Superficial e profunda
C) Superior e inferior
D) Esquerda e direita

QUESTÃO 9 – A ausculta pulmonar é uma técnica que compõe o exame físico. Ao examinar-se um paciente que apresenta estertores bolhosos (sons de bolha), juntamente com um intenso desconforto respiratório e hipossaturação, suspeita-se da seguinte anormalidade nos pulmões:

A) Líquido nos alvéolos
B) Alvéolos colabados
C) Derrame pleural
D) Estreitamento das vias aéreas

QUESTÃO 10 – Foi prescrito ao paciente F.R.T 55mg de hidrocortisona. A farmácia disponibilizou frasco de 100mg e de 500mg com diluente de 2 ml. Você irá administrar quantos ml do medicamento do frasco de 100mg e do frasco de 500mg, respectivamente?

A) 1,1 e 0,2
B) 0,2 e 1,1
C) 1,2 e 0,2
D) 1,1 e 0,1

QUESTÃO 11 - Conforme a via de administração da medicação, existem peculiaridades referentes a cada uma. Quanto as medicações prescritas via intramuscular, intradérmica e subcutânea a agulha deve ser inserida na pele, **respectivament**e, formando um ângulo de:

A) 50º, 60º e 70º
B) 90º, 15º e 35º
C) 50º, 15º e 45º

D) 90º, 15º e 45º

QUESTÃO 12 - Sobre a melhor conduta da oxigenoterapia administrada a um paciente de 60 anos de idade com quadro de pneumonia, dispneia e saturação de O_2 68% em ar ambiente, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Administrar oxigênio 2 litros/minuto por meio de cânula nasal.
B) Administrar oxigênio 3 litros/minuto por meio de cateter nasal.
C) Administrar oxigênio em máscara de Venturi a 50%.
D) Administrar oxigênio 5 litros/minuto por meio de máscara facial.

QUESTÃO 13 - Assinale a alternativa que apresenta, **CORRETAMENTE**, a causa de estertor em um paciente com insuficiência respiratória aguda:

A) Secreções bloqueando as vias aéreas brônquicas.
B) Alvéolos colapsados ou cheios de líquido que se abrem.
C) Consolidação dos alvéolos pulmonares.
D) Resistência na passagem de ar pela traqueia.

QUESTÃO 14 - Sobre os cuidados de enfermagem com a drenagem do tórax por presença de ar na cavidade torácica, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Encher o frasco de drenagem com 100 ml de soro glicosado ou soro fisiológico.
B) Borbulhamentos constantes no frasco indicam que o excesso de ar está sendo drenado.
C) É contraindicado ordenha do dreno na direção do frasco de drenagem.
D) Manter o tubo, no frasco de drenagem, imerso em pelo menos 2 cm de líquido.

QUESTÃO 15 - A transfusão sanguínea é um procedimento que requer cuidados específicos, capazes de garantir a segurança do paciente. Considerando a Norma técnica aprovada pela Resolução COFEN 0511/2016, que dispõe sobre a atuação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em Hemoterapia, analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem necessários no momento pós-procedimento transfusional.

I. Garantir que os sinais vitais sejam aferidos e compará-lo com as medições de referência.
II. Descartar adequadamente o material utilizado e assegurar que todos os procedimentos técnicos, administrativos, de limpeza, desinfecção e do gerenciamento de resíduos, sejam executados em conformidade com os preceitos legais e critérios técnicos cientificamente comprovados.
III. Confirmar obrigatoriamente a identificação do receptor, do rótulo da bolsa, dos dados da etiqueta de liberação, a validade do produto, a realização de inspeção visual da bolsa (cor e integridade) e temperatura, através de dupla checagem (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) para segurança do receptor.
IV. Registrar e documentar todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia de forma a garantir a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino final, incluindo a identificação do profissional que realizou o procedimento.
V. Monitorar o paciente quanto a resposta e a eficácia do procedimento.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) As afirmativas I e IV estão corretas.
B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
C) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 16 - Sobre o tempo de infusão para cada tipo de hemoderivado, marque a sequência **CORRETA** de verdadeiros (V) ou falsos (F), considerando as assertivas abaixo.

( ) O concentrado de hemácias deverá ser infundido de 240 a 360 minutos, sendo esse tempo somente para cada unidade (bolsa) a ser transfundida. Esse tempo de transfusão é determinado somente para pacientes adultos.
( ) O concentrado de plaquetas deverá ser infundido em até 30 minutos tanto para adultos quanto para crianças. O ideal é que o tempo de infusão não exceda a velocidade de 20-30ml/kg/hora.
( ) O plasma fresco congelado deverá ser infundido em até uma (1) hora.
( ) O crioprecipitado deverá ser infundido lentamente, não podendo ultrapassar quatro (4) horas do início.

A) F, F, F, F
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F

QUESTÃO 17 - A sra. M.L.T, 92 anos, possui disfagia severa relacionado a diagnóstico médico de doença de Alzheimer (transtorno neurológico degenerativo). Apresentava perda ponderal acima de 20% e passou a receber nutrição enteral por sonda transpilórica. O diagnóstico de enfermagem inicial para esta situação foi de ingestão nutricional inadequada. É **INCORRETO** estabelecer a seguinte intervenção de enfermagem para atenuar esse problema:

A) Sempre que possível, pesar paciente em jejum diariamente, de preferência no mesmo horário.
B) Assegurar que os exames laboratoriais e clínicos sejam realizados e observar alterações antropométricas, bioquímicas e hematológicas.
C) Aplicar o instrumento EAT-10 para triagem a beira do leito com o objetivo de detectar riscos de distúrbios da deglutição (disfagia).
D) Infundir a nutrição enteral, de acordo a prescrição médica, com especial atenção para o gotejamento do volume total a ser administrado. Atentar para sintomas de intolerância como náuseas, vômitos, diarreia, distensão abdominal.

QUESTÃO 18 - J.M.A, 32 anos, internado na clínica cirúrgica, está no 5° PO de gastrostomia por via endoscópica percutânea (PEG). Possui paraplegia e deficiência intelectual. A introdução alimentar enteral aconteceu sem intercorrências. Contudo, no segundo dia foi observado que o mesmo apresentava diarreia e distensão abdominal. De acordo com a RDC Nº 503, de 27/05/21, quais estratégias podem ser utilizadas para evitar as complicações acima citadas:

I. Manter a qualidade microbiológica do conteúdo durante conservação, preparo, transporte e administração.
II. O gotejamento deve obedecer ao tempo de infusão em 20 minutos, para não sofrer precipitações de suas partículas.
III. Acompanhar a evolução nutricional para detectar precocemente a intolerância aos componentes da fórmula escolhida ou se há excesso de gordura.
IV. A manipulação e administração da dieta devem ser realizadas de acordo com o tipo de dieta a cada 36 horas.
V. A infusão da dieta quando ocorrer por gotejamento, deverá ser administrada em um tempo superior a 30 minutos e em temperatura ambiente.

Das assertivas acima, são **CORRETAS:**

A) I, III, V
B) I, II, III
C) I, II, III, IV
D) II, IV, V

QUESTÃO 19 - A prevalência de dor em um paciente com câncer aumenta com a progressão da doença. A dor moderada ou intensa ocorre em 30% dos pacientes recebendo tratamento e em 60% a 90% dos pacientes com câncer avançado. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta a terminologia **CORRETA** para dor causada por estímulo que normalmente não é doloroso.

A) Hiperpatia
B) Disestesia
C) Hiperalgesia
D) Alodínia

QUESTÃO 20 – A Síndrome de Cushing, resulta da secreção excessiva de um ou todos os hormônios adrenocorticais: cortisol, aldosterona e os corticoides adrenocorticais. Quanto à assistência de enfermagem a estes pacientes, analise e julgue as afirmativas a seguir em (V) Verdadeiras e (F) Falsas.

( ) Instruir o paciente sobre mecânica corporal adequada, evitando dor e lesões durante as atividades simples.
( ) Avaliar a pele com frequência para detectar presença de áreas avermelhadas, rupturas, escoriação, infecção ou edema.
( ) Incentivar o consumo de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio, para manter em equilíbrio a pressão arterial.
( ) Monitorar o balanço hídrico, pesar diariamente, verificar a glicemia e acompanhar o resultado dos eletrólitos no sangue periférico.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA:**

A) F, V, V, F
B) F, F, F, V
C) V, V, F, V
D) V, V, V, F

QUESTÃO 21 - Em um atendimento de emergência, o enfermeiro administrou uma dose de Insulina Regular superior a prescrita. Assim que observou o erro, procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Considerando o erro de medicação como uma infração e diante da conduta do enfermeiro, pode-se considerar esta circunstância como:

A) Agravante
B) Atenuante
C) Equivocada
D) Distorcida

QUESTÃO 22 - Para a realização da avaliação primária de um paciente politraumatizado, a primeira prioridade é:

A) Identificar sinais de hipotermia.
B) Verificar locais de hemorragia e permeabilidade das vias aéreas.
C) Verificar os sinais vitais.
D) Realizar exame físico detalhado.

QUESTÃO 23 - Dos fatores que afetam a determinação da Saturação de Oxigênio de Pulso (SpO_2) é **CORRETO** afirmar que:

A) A hipotermia sistêmica interfere na absorção de luz e na capacidade do oxímetro processar a luz refletida.
B) Os vasoconstritores farmacológicos, por exemplo a epinefrina, aumentam o volume do pulso periférico.
C) O monóxido de carbono, por inalação de fumaça ou envenenamento, eleva artificialmente SpO2 através da absorção de luz similar ao oxigênio.
D) A doença vascular periférica ou aterosclerose aumenta o volume de pulso.

QUESTÃO 24 - Alguns requisitos gerais são adequados ao enfermeiro habilitado para trabalhar no atendimento pré-hospitalar móvel, **EXCETO**:

A) Equilíbrio emocional e autocontrole.
B) Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências.
C) Dificuldade para executar trabalho em equipe.
D) Iniciativa e facilidade de comunicação.

QUESTÃO 25 - Os principais sinais/sintomas da crise tireotóxica, enquadram-se, **EXCETO**:

A) Hipertermia
B) Taquicardia com ritmo de fibrilação atrial
C) Hipertensão arterial
D) Bradicardia

QUESTÃO 26 - É **CORRETO** afirmar que a alcalose respiratória é causada por:

A) Aumento da ventilação e diminuição da PCO2.
B) Diminuição da concentração de bicarbonato no LEC.
C) Diminuição da ventilação e aumento da PCO_2.
D) Aumento da concentração de bicarbonato no LEC.

QUESTÃO 27 - É **CORRETO** afirmar que entre os cuidados com a infusão subcutânea de morfina somente permite-se a manutenção do mesmo local de punção por até:

A) Três (3) dias
B) Duas (2) semanas
C) Quatro (4) semanas
D) Sete (7) dias

QUESTÃO 28 - A Classificação de Risco de Manchester é a estratificação de risco dos usuários que procuram atendimento nos serviços de saúde. Ao dar entrada em uma unidade de saúde, o paciente é classificado e recebe uma prioridade, que determina o tempo-alvo para o primeiro atendimento médico. Essa prioridade é baseada na situação clínica apresentada, e não na ordem de chegada. A este respeito, **assinale** a alternativa que apresenta a prioridade da cor laranja.

A) Atendimento não emergente
B) Emergência
C) Atendimento muito urgente
D) Atendimento urgente

QUESTÃO 29 - A insuficiência e/ou suspensão de insulina e também do uso concomitante de agentes que causem hiperglicemia podem resultar na complicação chamada cetoacidose. A este respeito, é **CORRETO** afirmar que pessoas com cetoacidose poderão apresentar:

A) Poliúria, polidipsia, desidratação, rubor facial, náuseas, vômito, sonolência e hálito cetônico.
B) Polidipsia, desidratação, rubor facial, náuseas e vômito seguidos de hálito cetônico, diarreia e poliúria.
C) Náuseas, vômito, sonolência, hálito cetônico, tonturas, cansaço e fortes dores abdominais.
D) Sonolência, hálito cetônico, cansaço, inchaços e vermelhidão no corpo.

QUESTÃO 30 - O acidente vascular cerebral isquêmico ou transitório caracteriza-se por episódios súbitos da perda de função motora, sensitiva ou visual com recuperação em 24 horas. A este respeito, é **CORRETO** afirmar que a maioria dos acidentes tem duração de:

A) Aproximadamente três horas, e pode durar mais de 6 horas.
B) Alguns minutos, e a minoria pode durar mais de 8 horas.
C) Minutos até uma hora, e a minoria pode durar mais de 4 horas.
D) Duas horas, e a minoria pode durar mais de 12 horas.

QUESTÃO 31 - Para as situações que a equipe de saúde pode encontrar ao cuidar de uma pessoa com alterações de consciência, JULGUE as afirmativas em (V) verdadeiras ou (F) falsas e, em seguida, **ASSINALE** a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

( ) Torpor – a pessoa permanece dormindo, com dificuldade de responder a estímulos verbais, porém reage aos estímulos dolorosos.
( ) Coma – a pessoa não responde a estímulos verbais ou dolorosos e nem apresenta reação aos reflexos de tosse, vômitos e da córnea.
( ) Letargia – a pessoa apresenta-se apática, sem expressão, a fala e os movimentos só ocorrem quando estimulados, mantém-se sonolenta, perdida
no tempo e no espaço, ou seja, "fora de órbita."
( ) Confusão – a pessoa perde a capacidade de raciocínio rápido, lógico e com clareza. Encontra-se desorientada no tempo e no espaço e, às vezes, torna-se inquieta e agitada.

A) V, V, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) F, F, F, V

QUESTÃO 32 - Angina *pectoris* ou angina do peito é a síndrome clínica caracterizada por crises de dor, queimação ou sensação de pressão na região do tórax. É causada pela obstrução transitória das coronárias. A causa da dor é o fornecimento inadequado de sangue ao coração, resultando no suprimento insuficiente de oxigênio e de nutrientes para o miocárdio. Para que não ocorra a indicação de infarto agudo do miocárdio, a dor da angina deve cessar com repouso ou com o uso da nitroglicerina, em um período de:

A) Uma hora.
B) Trinta minutos.
C) Quinze minutos.
D) Vinte minutos.

QUESTÃO 33 - Na avaliação neurológica de um paciente, o enfermeiro precisa estar apto para reconhecer e intervir nos achados do exame físico. Quanto aos distúrbios neurológicos, leia as afirmativas abaixo e **JULGUE**-as em (V) verdadeiras ou (F) falsas:

( ) A escala de coma de Glasgow (ECG) tem por objetivo avaliar, de forma rápida, o nível de consciência. Utilizando apenas a ECG como instrumento de avaliação, é possível monitorar e localizar a disfunção neurológica.
( ) A insuficiência vascular cerebral é causada por placa aterosclerótica ou trombose, aumento da PCO2, diminuição da PO2, diminuição da viscosidade sanguínea e aumento da pressão intracraniana (PIC).
( ) São fatores de risco para Acidente Vascular Cerebral: distúrbios cardíacos (valvulopatias, cardiopatias congênitas, endocardites, consumo de cocaína e hereditariedade).
( ) Dentre as complicações do aneurisma cerebral, podem ser citadas: ressangramento do aneurisma, hidrocefalia, convulsões e liberação anormal de catecolaminas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA:**

A) F-F-V-F
B) V-V-F-V
C) F-V-V-V
D) F-V-F-F

QUESTÃO 34 - A retirada rápida de vítimas de locais confinados e veículos é um princípio, por meio do qual se busca estabilizar manualmente o paciente com lesões graves antes e durante a mobilização da posição sentada. Ela é escolhida, apenas, quando existem condições de risco à vida, como:

A) Quando o paciente se encontra em posição prona ou deitado de barriga para baixo, girando-o na direção oposta à sua face.
B) Quando o transporte é prolongado, e a estabilização da coluna cervical não foi realizada com imobilizadores laterais.
C) Quando o paciente precisa ser removido rapidamente, para que se tenha acesso a outros pacientes com lesões mais graves.
D) Quando se necessita de grandes adaptações ao método de imobilização de criança pequena na prancha longa.

QUESTÃO 35 - Uma forma rápida e simples de se avaliar um paciente politraumatizado em 10 segundos é:

A) Averiguar o risco de morte para qualquer tipo de trauma que resulte em escores baixos ou moderados na escala Injury Severity Score.
B) Identificar se o doente tem via aérea difícil e se consegue comunicar-se verbalmente de forma clara e sem elevação do mento.
C) Garantir que a cabeça e o pescoço do doente não sejam hiperestendidos, hiperfletidos ou rodados para manter via aérea.
D) Avaliar os doentes e estabelecer as prioridades de tratamento, de acordo com suas lesões, seus sinais vitais e mecanismo de lesão.

QUESTÃO 36 - Você e a sua equipe do Suporte Básico de Vida (SBV) foram chamadas para um atendimento a múltiplas vítimas (IMV), sendo uma das atribuições como socorrista a triagem em foco, utilizando uma técnica padrão, sendo a mais usada o fluxograma START. Em relação à aplicação da triagem de foco método START, **RELACIONE** a primeira coluna com a segunda e a seguir **ASSINALE** a alternativa que contenha as correspondências **CORRETAS**.

COLUNA 1	
a	Gestante, presença de sangramento vaginal visualizado, presença de sangue na roupa, consegue andar, respira, FR 28irmp, enchimento capilar 2 segundos, responde ordem simples.
b	Não consegue andar, respira com FR > 30irpm, pulso radial ausente, não responde a ordem simples.
c	Não consegue andar, respira, FR 29irpm, pulso radial presente, responde ordens simples.

COLUNA 2	
I	Vítima vermelha
II	Vítima amarela
III	Vítima verde

d	Não consegue andar, respira com FR 35irpm, enchimento capilar 1 segundo, responde a ordens simples.	IV	Vítima cinza ou inviável
e	Não consegue andar, não respira com FR 0irpm, após abertura de vias aéreas, FR 0irpm, enchimento capilar 9 segundos, não responde a ordens simples.		
f	Uma vítima, criança, de 8 anos de idade, não consegue andar, respira, FR 27irpm, enchimento capilar 1 segundo, responde a ordens simples. (G) Não consegue andar, não respira com FR 0irpm, após abertura de vias aéreas FR 8irpm, não responde a ordens simples.		

A) a-III, b-I, c-II, d-II, e-IV, f-II
B) a-I, b-II, c-III, d-III, e-III, f-I
C) a-III, b-II, c-I, d-II, e-IV, f-II
D) a-II, b-I, c-III, d-I, e-III, f-IIII

QUESTÃO 37 - O SAMU 192 é um importante componente da Política Nacional de Atenção às Urgências para a vida do cidadão e para garantir a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde-SUS. Dentro do perfil dos atendimentos realizados pelo SAMU, destacam-se as urgências e as emergências clínicas. Relacione a primeira coluna com a segunda e a seguir assinale a alternativa que contenha as correspondências **CORRETAS**.

COLUNA 1		**COLUNA 2**	
a	Desordem do sistema cardiovascular. Uma das causas pode ser por obstrução de um vaso ou a sua luz comprimida por um tumor ou trauma.	I	Crise convulsiva
b	Ruptura ou erosão da placa ateromatosa e consequentemente trombose superposta, resultando um desequilíbrio na relação entre oferta e demanda de oxigênio do músculo cardíaco, produzindo isquemia aguda e persistente.	II	Hipertensão Arterial
c	Ocorre uma desordem cerebral. Durante um breve período de tempo, o cérebro deixa de funcionar normalmente e passa a enviar estímulos desordenados ao resto do corpo.	III	Acidente vascular encefálico isquêmico
d	Ruptura de vaso sanguíneo cerebral com sangramento para dentro do tecido cerebral ou dos espaços que circulam o cérebro.	IV	Acidente vascular encefálico hemorrágico
e	Bloqueios nas artérias coronárias, chamadas placas, impedem que o sangue suficiente alcance o músculo cárdico, em atividades ou situações que requeiram aumento do fluxo sanguíneo para o coração, podem causar dor.	V	Síndrome coronariana aguda
f	A produção de insulina no pâncreas é insuficiente, pois suas células sofrem o que se chama de destruição autoimune.	VI	Angina

g	Ocorre necrose da célula miocárdica resultante da oferta inadequada de oxigênio ao músculo cardíaco.	VII	Infarto agudo do miocárdio
h	É uma doença silenciosa e de maior prevalência na população, caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial elevados associados à alteração no metabolismo do organismo, nos hormônios e na musculatura cardíaca e vascular.	VIII	Diabetes Mellitus tipo I
i	Ocorre geralmente em pessoas obesas, em virtude de maus hábitos, como alimentares, sedentarismo e estresse da vida urbana. Observa-se a presença de insulina, porém ocorre o que é conhecido como resistência insulínica.	IX	Diabetes Mellitus tipo II

A) a-II, b-VII, c-IV, d-V, e-I, f-III, g-IX, h-VI, i-VIII.
B) a-IV, b-III, c-II, d-I, e-V, f-VI, g-VII, h-VIII, i-IX.
C) a-III, b-II, c-I, d-IV, e-VII, f-V, g-VI, h-IX, i-VIII.
D) a-III, b-V, c-I, d-IV, e-VI, f-VIII, g-VII, h-II, i-IX.

QUESTÃO 38 - O incêndio na boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, foi o incidente que ocasionou a morte de mais de duas centenas de pessoas e feriu outras centenas em uma discoteca localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O sinistro foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Gran Circus Norte-Americano. Diante de um atendimento à vítima de queimadura é **INCORRETO** afirmar:

A) O paciente grande queimado precisa de atenção por serem os riscos de hipovolemia, sepse, e insuficiência respiratória os principais sinais de alerta do paciente.
B) Em um atendimento pré-hospitalar a vítimas de queimaduras, devemos priorizar o controle de cena e a segurança da equipe.
C) A etapa inicial do atendimento de uma vítima de queimadura é a interrupção do processo de lesão.
D) A extensão da queimadura é avaliada através da percentagem de superfície corporal queimada.

QUESTÃO 39 - As serpentes do gênero *Bothrops* são encontradas em todo o território nacional, compreendendo 20 espécies. Baseado em dados do Ministério da Saúde devem ocorrer anualmente mais de 17 (dezessete) mil acidentes botrópicos com letalidade em torno de 0,6% nos casos tratados. Com base no texto acima, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Cobra cascavel faz parte deste gênero *Bothrops*.
B) As serpentes do gênero *Bothrops* têm hábito diurno e habitam locais secos, sendo consideradas serpentes menos agressivas.
C) O veneno das serpentes do gênero *Bothrops* tem ação neurotóxica, miotóxica e coagulante.
D) O veneno das serpentes do gênero *Bothrops* tem ação proteolítica e pode levar a um estado de incoagulabilidade sanguínea.

QUESTÃO 40 - Com relação às drogas, a equipe do Suporte Básico de Vida (SBV) deve entender como dependência psicológica:

A) Não há sinais clínicos evidentes para avaliação primária.
B) O tratamento da dependência de drogas não deve ser visto como uma emergência clínica.
C) Presença de sinais de abstinência de álcool e drogas.
D) A dependência psicológica é mais fácil de ser tratada do que a física.