PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM OBSTETRÍCIA

PROCESSO SELETIVO EDITAL 079/2024-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

QUESTÃO 1 - A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Em seu capítulo II estabelece os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS). Baseado no capítulo II da referida Lei, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) A Universalidade é um dos princípios do SUS e garante o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
B) É direito da pessoa assistida o acesso à informação sobre sua situação de saúde.
C) As informações epidemiológicas devem ser utilizadas somente para a orientação programática.
D) A gestão do SUS deve se dar de forma descentralizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo.

QUESTÃO 2 - A Política Nacional de Humanização (PNH), define que o Acolhimento implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, e, quando for o caso, orientar o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência, estabelecendo articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2003). A Classificação de Risco faz parte dessa política de atendimento. Neste contexto é correto afirmar:

A) É realizada por todos os profissionais da unidade de saúde, sendo desnecessários protocolos técnicos para identificar os pacientes com potencial de risco, agravo a saúde ou o grau de sofrimento.
B) Mudança na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada (burocrática).
C) As cores significam a prioridade no atendimento, sendo vermelho: Urgência; Amarelo: Emergência; Verdes: Não urgência e Azul: Condições agudas.
D) Todas as anteriores estão corretas.

QUESTÃO 3 - As ações de educação em saúde constituem-se na essência da Promoção da Saúde. Considerando esta afirmação, as alternativas abaixo citam ações consideradas de Promoção da Saúde, **EXCETO**:

A) Reunião com grupos de idosos.
B) Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
C) Distribuição de medicamentos.
D) Orientação à gestante quanto à amamentação.

QUESTÃO 4 - No que se refere ao Código De Ética dos profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo:

I. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
II. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por período superior a 29 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem (COREN), jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
III. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
IV. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.
V. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são: advertência verbal; multa, censura, suspensão do direito do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta **CORRETA**:

A) Somente I, II e III estão corretas
B) Somente I, III, IV e V estão corretas
C) Somente II e V estão corretas
D) Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 5 - O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (Coren), são entidades autônomas de interesse público O COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. De acordo com o código do exercício profissional de Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro **EXCETO**:

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
C) Prescrição da assistência de enfermagem.
D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

QUESTÃO 6 - O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 726 de 15 de setembro de 2023. A Resolução COFEN nº 736 de 17 de Janeiro de 2024, dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Analise as questões abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, Protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base.
( ) Os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e ações/atividades de enfermagem podem ser apoiadas nos Sistemas de Linguagem Padronizada de Enfermagem, em protocolos institucionais, e com os melhores níveis de evidências científicas.
( ) Planejamento de Enfermagem – compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
( ) Os profissionais de enfermagem bem como as instituições de saúde devem buscar os meios necessários para a capacitação/qualificação na utilização do Processo de Enfermagem.

Assinale a sequência **CORRETA**:

A) V, F, V, F
B) V, F, V, V
C) V, V, V, V
D) V, F, F, V

QUESTÃO 7 – A Resolução 736/2024 Art. 4º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, descritas abaixo. Assim, correlacione as colunas e marque a alternativa **CORRETA:**

(I) Avaliação de Enfermagem	( ) Determinação de resultados (quantitativos e/ou qualitativos) esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde
(II) Diagnóstico de Enfermagem	( ) Padrões de cuidados em Programas de Saúde: cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares
(III) Planejamento de Enfermagem	( ) compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.
(IV) Implementação de Enfermagem	( ) compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática

(V) Evolução de Enfermagem	( ) compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais.

Assinale a sequência **CORRETA**:

A) III, IV, V, II, I
B) III, IV, V, I, II
C) III, V, IV, II, I
D) IV, III, I, V, II

QUESTÃO 8 – A região abdominal é complexa por abrigar órgãos vitais. A avaliação semiológica abdominal é fundamental para identificar condições clínicas, que podem ser benignas ou graves. Uma das etapas do exame físico do abdome, é a palpação. Assinale a alternativa que contém os dois momentos da palpação abdominal.

A) Lateral e transversal
B) Superficial e profunda
C) Superior e inferior
D) Esquerda e direita

QUESTÃO 9 – A ausculta pulmonar é uma técnica que compõe o exame físico. Ao examinar-se um paciente que apresenta estertores bolhosos (sons de bolha), juntamente com um intenso desconforto respiratório e hipossaturação, suspeita-se da seguinte anormalidade nos pulmões:

A) Líquido nos alvéolos
B) Alvéolos colabados
C) Derrame pleural
D) Estreitamento das vias aéreas

QUESTÃO 10 – Foi prescrito ao paciente F.R.T 55mg de hidrocortisona. A farmácia disponibilizou frasco de 100mg e de 500mg com diluente de 2 ml. Você irá administrar quantos ml do medicamento do frasco de 100mg e do frasco de 500mg, respectivamente?

A) 1,1 e 0,2
B) 0,2 e 1,1
C) 1,2 e 0,2
D) 1,1 e 0,1

QUESTÃO 11 - Conforme a via de administração da medicação, existem peculiaridades referentes a cada uma. Quanto as medicações prescritas via intramuscular, intradérmica e subcutânea a agulha deve ser inserida na pele, **respectivament**e, formando um ângulo de:

A) 50º, 60º e 70º
B) 90º, 15º e 35º
C) 50º, 15º e 45º

D) 90º, 15º e 45º

QUESTÃO 12 - Sobre a melhor conduta da oxigenoterapia administrada a um paciente de 60 anos de idade com quadro de pneumonia, dispneia e saturação de O_2 68% em ar ambiente, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Administrar oxigênio 2 litros/minuto por meio de cânula nasal.
B) Administrar oxigênio 3 litros/minuto por meio de cateter nasal.
C) Administrar oxigênio em máscara de Venturi a 50%.
D) Administrar oxigênio 5 litros/minuto por meio de máscara facial.

QUESTÃO 13 - Assinale a alternativa que apresenta, **CORRETAMENTE**, a causa de estertor em um paciente com insuficiência respiratória aguda:

A) Secreções bloqueando as vias aéreas brônquicas.
B) Alvéolos colapsados ou cheios de líquido que se abrem.
C) Consolidação dos alvéolos pulmonares.
D) Resistência na passagem de ar pela traqueia.

QUESTÃO 14 - Sobre os cuidados de enfermagem com a drenagem do tórax por presença de ar na cavidade torácica, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) Encher o frasco de drenagem com 100 ml de soro glicosado ou soro fisiológico.
B) Borbulhamentos constantes no frasco indicam que o excesso de ar está sendo drenado.
C) É contraindicado ordenha do dreno na direção do frasco de drenagem.
D) Manter o tubo, no frasco de drenagem, imerso em pelo menos 2 cm de líquido.

QUESTÃO 15 - A transfusão sanguínea é um procedimento que requer cuidados específicos, capazes de garantir a segurança do paciente. Considerando a Norma técnica aprovada pela Resolução COFEN 0511/2016, que dispõe sobre a atuação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em Hemoterapia, analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem necessários no momento pós-procedimento transfusional.

I. Garantir que os sinais vitais sejam aferidos e compará-lo com as medições de referência.
II. Descartar adequadamente o material utilizado e assegurar que todos os procedimentos técnicos, administrativos, de limpeza, desinfecção e do gerenciamento de resíduos, sejam executados em conformidade com os preceitos legais e critérios técnicos cientificamente comprovados.
III. Confirmar obrigatoriamente a identificação do receptor, do rótulo da bolsa, dos dados da etiqueta de liberação, a validade do produto, a realização de inspeção visual da bolsa (cor e integridade) e temperatura, através de dupla checagem (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) para segurança do receptor.
IV. Registrar e documentar todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia de forma a garantir a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino final, incluindo a identificação do profissional que realizou o procedimento.
V. Monitorar o paciente quanto a resposta e a eficácia do procedimento.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) As afirmativas I e IV estão corretas.
B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
C) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
D) Somente a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 16 - Sobre o tempo de infusão para cada tipo de hemoderivado, marque a sequência **CORRETA** de verdadeiros (V) ou falsos (F), considerando as assertivas abaixo.

( ) O concentrado de hemácias deverá ser infundido de 240 a 360 minutos, sendo esse tempo somente para cada unidade (bolsa) a ser transfundida. Esse tempo de transfusão é determinado somente para pacientes adultos.
( ) O concentrado de plaquetas deverá ser infundido em até 30 minutos tanto para adultos quanto para crianças. O ideal é que o tempo de infusão não exceda a velocidade de 20-30ml/kg/hora.
( ) O plasma fresco congelado deverá ser infundido em até uma (1) hora.
( ) O crioprecipitado deverá ser infundido lentamente, não podendo ultrapassar quatro (4) horas do início.

A) F, F, F, F
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F

QUESTÃO 17 - A sra. M.L.T, 92 anos, possui disfagia severa relacionado a diagnóstico médico de doença de Alzheimer (transtorno neurológico degenerativo). Apresentava perda ponderal acima de 20% e passou a receber nutrição enteral por sonda transpilórica. O diagnóstico de enfermagem inicial para esta situação foi de ingestão nutricional inadequada. É **INCORRETO** estabelecer a seguinte intervenção de enfermagem para atenuar esse problema:

A) Sempre que possível, pesar paciente em jejum diariamente, de preferência no mesmo horário.
B) Assegurar que os exames laboratoriais e clínicos sejam realizados e observar alterações antropométricas, bioquímicas e hematológicas.
C) Aplicar o instrumento EAT-10 para triagem a beira do leito com o objetivo de detectar riscos de distúrbios da deglutição (disfagia).
D) Infundir a nutrição enteral, de acordo a prescrição médica, com especial atenção para o gotejamento do volume total a ser administrado. Atentar para sintomas de intolerância como náuseas, vômitos, diarreia, distensão abdominal.

QUESTÃO 18 - J.M.A, 32 anos, internado na clínica cirúrgica, está no 5° PO de gastrostomia por via endoscópica percutânea (PEG). Possui paraplegia e deficiência intelectual. A introdução alimentar enteral aconteceu sem intercorrências. Contudo, no segundo dia foi observado que o mesmo apresentava diarreia e distensão abdominal. De acordo com a RDC Nº 503, de 27/05/21, quais estratégias podem ser utilizadas para evitar as complicações acima citadas:

I. Manter a qualidade microbiológica do conteúdo durante conservação, preparo, transporte e administração.
II. O gotejamento deve obedecer ao tempo de infusão em 20 minutos, para não sofrer precipitações de suas partículas.
III. Acompanhar a evolução nutricional para detectar precocemente a intolerância aos componentes da fórmula escolhida ou se há excesso de gordura.
IV. A manipulação e administração da dieta devem ser realizadas de acordo com o tipo de dieta a cada 36 horas.
V. A infusão da dieta quando ocorrer por gotejamento, deverá ser administrada em um tempo superior a 30 minutos e em temperatura ambiente.

Das assertivas acima, são **CORRETAS:**

A) I, III, V
B) I, II, III
C) I, II, III, IV
D) II, IV, V

QUESTÃO 19 - A prevalência de dor em um paciente com câncer aumenta com a progressão da doença. A dor moderada ou intensa ocorre em 30% dos pacientes recebendo tratamento e em 60% a 90% dos pacientes com câncer avançado. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta a terminologia **CORRETA** para dor causada por estímulo que normalmente não é doloroso.

A) Hiperpatia
B) Disestesia
C) Hiperalgesia
D) Alodínia

QUESTÃO 20 – A Síndrome de Cushing, resulta da secreção excessiva de um ou todos os hormônios adrenocorticais: cortisol, aldosterona e os corticoides adrenocorticais. Quanto à assistência de enfermagem a estes pacientes, analise e julgue as afirmativas a seguir em (V) Verdadeiras e (F) Falsas.

( ) Instruir o paciente sobre mecânica corporal adequada, evitando dor e lesões durante as atividades simples.
( ) Avaliar a pele com frequência para detectar presença de áreas avermelhadas, rupturas, escoriação, infecção ou edema.
( ) Incentivar o consumo de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio, para manter em equilíbrio a pressão arterial.
( ) Monitorar o balanço hídrico, pesar diariamente, verificar a glicemia e acompanhar o resultado dos eletrólitos no sangue periférico.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA:**

A) F, V, V, F
B) F, F, F, V
C) V, V, F, V
D) V, V, V, F

QUESTÃO 21 - A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher tem como objetivos promove a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis e ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta estratégias para o alcance desses objetivos:

A) Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde.
B) Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sem enfoque de gênero.
C) Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, para tratamento e controle de doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/aids, sem ações de promoção e prevenção nessa população.
D) Lutar pela legalização do aborto.

QUESTÃO 22 - No Brasil, é preconizada a atenção obstétrica e neonatal humanizada baseada em evidências científicas. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta princípios ou diretrizes da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal (Portaria nº. 1.067, de 4 de julho de 2005):

A) O resgate dos processos de gestação, do parto, do puerpério e do nascimento como experiências humanas das mais significativas, que envolvem apenas a mulher, não sendo necessária a presença de seu parceiro e de sua família.
B) Adoção de práticas e rotinas centradas nos benefícios do profissional, mesmo sem comprovação por evidências científicas.
C) O respeito às características fisiológicas da gestação, do parto, do nascimento e do puerpério, ao fortalecimento da autonomia da mulher e à preservação da sua privacidade.
D) Forte ênfase na utilização de tecnologia e intervenções segundo níveis crescentes de complexidade.

QUESTÃO 23 – A Rede Cegonha, recentemente rebatizada como Rede Alyne em 2024, foi organizada em quatro (4) Componentes,

I. Pré-Natal.
II. Parto e Nascimento.
III. Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança.
IV. Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação.

Assinale a alternativa **CORRETA** considerando as disposições acima:

A) I e II estão corretas
B) I e II estão incorretas
C) I, II, III estão corretas
D) Todas estão corretas

QUESTÃO 24 - "A consulta de enfermagem é uma atividade independente, realizada privativamente pelo enfermeiro, e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida, mediante uma abordagem contextualizada e participativa. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério de Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87" (Brasil, 2013). O roteiro da Consulta de enfermagem no pré-natal de risco habitual inclui:

I. Anamnese e exame físico geral.
II. Verificação da situação vacinal e orientação sobre a sua atualização, se necessário.
III. Análise de resultados de exames complementares solicitados anteriormente.
IV. Exame gineco-obstétrico (medida da altura de fundo uterino, ausculta dos batimentos cardiofetais e realização das Manobras de Leopold).
V. O registro do atendimento e os achados devem ser realizados apenas no prontuário da gestante na unidade.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) I, II, III e V
B) I, II, III e IV
C) II, III, IV e V
D) I, II, III, IV e V

QUESTÃO 25 - De acordo com a Regra de Naegele, assinale a alternativa da data provável do parto (DPP), tendo a base a data da última menstruação (DUM): 15/04/2024.

A) 03/02/2025
B) 22/01/2025
C) 21/12/2024
D) 30/12/2024

QUESTÃO 26 - A evolução clínica do parto pode ser dividida em 4 períodos. Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA** dos períodos do parto:

A) Período de Greenberg; Dequitação; Dilatação; Expulsão.
B) Dequitação; Dilatação; Expulsão; Período de Greenberg.
C) Dilatação; Expulsão; Dequitação; Período de Greenberg.
D) Dilatação; Expulsão; Período de Greenberg; Dequitação.

QUESTÃO 27 – O períneo é responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos, pelo controle urinário e fecal, função sexual e obstétrica. Julgue as afirmativas abaixo em verdadeira (V) e para falsas (F) e assinale a alternativa correta.

( ) Músculos isquiocavernosos, músculos bulbocavernosos e esfíncter externo do ânus são exemplos de músculos superficiais do períneo.
( ) O centro tendíneo do períneo é uma massa fibro-elástica de forma piramidal, com cerca de 2 centímetros situado em posição mediana, no limite dos trígonos urogenital e anal, alguns músculos se prendem a ele.

( ) O períneo tem grande importância funcional nos períodos do parto e pós-parto, requerendo atenção e cuidados específicos para essas fases.
( ) A musculatura do períneo é formada por uma única camada, denominada de musculatura superficial.

Marque a alternativa **CORRETA**:

A) V, V, V, F
B) V, F, V, F
C) F, F, V, F
D) V, F, F, F

QUESTÃO 28 - Gestante com 28 anos de idade, G3P2A0, com 40 semanas de gestação, apresentando contrações uterinas e dilatação cervical de 6 cm, bolsa rota. A apresentação encontrava-se no plano 0 de DeLee em OEP. A variação de posição descrita refere-se a:

A) Apresentação pélvica, situação longitudinal e posição direita.
B) Apresentação cefálica fletida, situação longitudinal e posição esquerda.
C) Apresentação cefálica fletida, situação oblíqua e posição posterior.
D) Apresentação cefálica defletida de 1º grau, situação longitudinal e posição esquerda.

QUESTÃO 29 - M.J.C., 24 anos está em trabalho de parto ativo, apresentando dilatação de 4cm e, repentinamente, não apresenta evolução. Suas contrações enfraquecem em intensidade e frequência. Você interpreta esse achado como um sinal de:

A) Trabalho de parto disfuncional.
B) Trabalho de parto hipertônico.
C) Trabalho de parto precipitado.
D) Trabalho de parto hipotônico.

QUESTÃO 30 - Em que situação está indicada a gamaglobulina hiperimune anti-D em mulher Rh negativo?

A) Paciente com Coombs indireto negativo, com aplicação até no máximo 72 horas. Após parto de recém-nascido vivo Rh negativo.
B) Paciente com Coombs indireto positivo, após parto de recém-nascido vivo Rh positivo, preferencialmente nas primeiras 72 horas.
C) Paciente com Coombs indireto negativo, após parto de recém-nascido vivo ou morto Rh positivo, preferencialmente nas primeiras 72 horas.
D) Paciente com Coombs direto positivo, após parto de recém-nascido vivo Rh positivo, preferencialmente nas primeiras 72 horas.

QUESTÃO 31 - Define-se como Placenta Prévia, aquela que se implanta total ou parcialmente no segmento inferior do útero. Ocorre em 1 a cada 200 gestações que chegam ao terceiro trimestre. São consideradas como fatores de risco, **EXCETO**:

A) Cesariana prévia

B) Gemelaridade
C) Incompetência istmo cervical
D) Tabagismo

QUESTÃO 32 – I.G.O., 32 anos, GII/PI/A0 (1 PN), IG: 32 sem (USG 2°trim), portadora de HPV, chega ao pronto socorro com queixa de sangramento vaginal, dores abdominais intensas e contínuas há 3 horas, nega episódios semelhante anteriores nesta gestação, ao exame: hipocorada (++/4+); PA: 150x100 mmHg; pulso: 110 bpm; AFU: 32 cm; Bcf: 112 bpm; metrossístoles ausentes, porém tônus uterino lenhoso; presença de sangue escuro ao exame especular. Ao toque: colo uterino 50% apagado, dilatado 4 cm, cefálico. O diagnóstico provável, a conduta e a principal complicação, respectivamente:

A) Placenta prévia, aguardar parto normal, óbito fetal.
B) Rotura uterina, laparotomia exploradora, choque hipovolêmico.
C) Descolamento prematuro de placenta, cesariana de imediato, útero de Couvelaire e CIVD.
D) Descolamento prematuro de placenta, corticoide e cesariana com 34 sem, útero de Couvelaire.

QUESTÃO 33 - Sepse e choque séptico são fases evolutivas de quadros infecciosos que acabam levando a um comprometimento da perfusão de múltiplos órgãos, podendo provocar a disfunção dos mesmos e morte. Quais são os principais focos infecciosos que levam aos quadros sépticos nas gestantes e puérperas?

A) Abdome agudo, apendicite, pancreatite.
B) Vaginite, vaginose bacteriana, colecistite.
C) Aborto séptico, endometrite puerperal, infecção ovular.
D) Nenhuma das Anteriores.

QUESTÃO 34 - Analise as afirmativas relacionadas as síndromes hipertensivas da gravidez, e assinale a alternativa correta.

A) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª. semana de gestação, classicamente pelo desenvolvimento gradual de hipertensão sem presença de proteinúria.
B) Em gestante com quadro convulsivo, o primeiro diagnóstico a ser considerado deve ser a pre-eclâmpsia.
C) Mulheres com hipertensão arterial pregressa, por mais de quatro anos, têm aumento do risco de desenvolver pré-eclâmpsia de cerca de 25%.
D) História familiar de doença renal e pre-eclâmpsia não são fatores de risco importante.

QUESTÃO 35 – De acordo com Brasil (2013), o abortamento é a expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500g. Desta forma, considera-se:

A) Abortamento precoce até 12ª. semana e tardio entre 13ª. e a 22ª. semanas.
B) Abortamento precoce até 10ª. semana e tardio entre 13ª. e a 22ª. semanas.
C) Abortamento precoce até 8ª. semana e tardio entre 13ª. e a 23ª. semanas;
D) Abortamento precoce até 19ª. semana e tardio entre 12ª. e a 22ª. semanas.

QUESTÃO 36 - A vitalidade ao nascer, é um determinante para a necessidade de reanimação neonatal, depende da avaliação simultânea de dois sinais. Esses sinais são:

A) Respiração e bom tônus muscular.
B) Respiração e frequência cardíaca.
C) Frequência cardíaca e gestação a termo.
D) Bom tônus muscular e frequência cardíaca.

QUESTÃO 37 - Em nascimentos considerados normais, o aleitamento materno deve ser iniciado:

A) Imediatamente ao nascimento.
B) Uma hora após o nascimento.
C) Duas horas após o nascimento.
D) Três horas depois.

QUESTÃO 38 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam que as crianças sejam alimentadas, exclusivamente, com leite materno até os seis meses de vida. Em relação ao tema, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) A exposição a fórmulas lácteas na maternidade, por vezes, é necessária, não apresentando relação significativa com o risco de alergia ao leite de vaca, desde que seja uma exposição pontual.
B) Quando a criança recebe leite materno, mas tem indicação de fazer uso de suplementos de vitaminas ou minerais, sua alimentação é definida como aleitamento materno suplementado.
C) O aleitamento materno confere proteção contra diarreia, infecções respiratórias, alergias, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e obesidade.
D) A concentração de gordura no leite materno aumenta no decorrer da mamada, por isso o leite anterior é mais rico em energia.

QUESTÃO 39 – A puérpera R.F.S de 39 anos, em união estável, procurou os serviços de saúde para encerramento de pré-natal. Ela informou que pariu feto vivo, único, em

22/11/2024. Durante a consulta puerperal a enfermeira investigou sobre o desejo da mulher em engravidar novamente. Esta negou este desejo. Diante da negativa da usuária, a enfermeira ofertou os métodos contraceptivos disponíveis no serviço. Assinale a alternativa com os métodos elegíveis para o caso apresentado.

A) Progestágeno (injeção trimestral), oral combinado, injeção mensal, DIU de cobre e métodos de barreira.
B) Oral combinado, minipílula, DIU de cobre e métodos de barreira.
C) Prostágeno (injeção trimestral), minipílula, DIU de cobre e métodos de barreira.
D) Prostágeno, DIU de cobre e oral combinado.

QUESTÃO 40 – M.P.C., 31 anos, G3P3A0, buscou o serviço de saúde para iniciar o planejamento reprodutivo. Durante a consulta informou ao enfermeiro que é hipertensa, faz uso contínuo de Losartana de 50 mg 1 vez ao dia, apresenta grau de obesidade II. Neste caso, são métodos contraceptivos elegíveis, **EXCETO**:

A) Norestisterona 0,35 mg (oral).
B) Enantato de Norestisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg (injetável mensal).
C) Preservativo masculino/feminino.
D) Acetato de medroxiprogesterona de 150 mg (injetável trimestral).