UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA

EDITAL 018/2025-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

ORIENTAÇÕES GERAIS, LEIA COM ATENÇÃO:

1) A prova terá duração de três (3) horas a partir de seu início autorizado pelo fiscal em sala.
2) Você está recebendo: um (1) caderno de prova com 40 questões, um (1) cartão resposta e folha em branca para rascunho. Você é responsável pela verificação do seu caderno de prova e do cartão resposta, e pela transcrição das respostas de seu caderno de prova para o cartão-resposta.
3) O cartão-resposta é personalizado com o seu nome, CPF e número de inscrição. Verifique se as informações estão corretas.
4) Para cada questão, você deverá marcar no cartão-resposta, apenas a alternativa que considerar correta. O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova das questões de 01 a 40, não tendo validade as marcações que forem feitas em qualquer outro lugar.
5) Registre as suas respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica azul ou preta, cobrindo todo o espaço correspondente a alternativa de sua escolha. Na correção do cartão-resposta será atribuída pontuação 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível, bem como naquelas em que a resposta não coincida com o gabarito oficial**. LEMBRE-SE:** são de sua inteira e exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta.
6) Não são permitidas consultas, nem a utilização de qualquer material ou equipamento eletrônico, durante a prova.
7) O(a) candidato(a) que, durante a realização da prova, for surpreendido(a) utilizando equipamento eletrônico e/ou material de uso não autorizado, ainda que desligado, terá sua prova anulada e será desclassificado(a) do processo seletivo.
8) É vedado, durante a realização da prova, ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal.
9) Após entregar o cartão-reposta e o caderno de prova, não será permitido retornar ao local de realização da prova em hipótese alguma.
10) Os três últimos candidatos deverão entregar a prova simultaneamente para assegurarmos a transparência e a lisura da avaliação.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA

EDITAL 018/2025-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

QUESTÃO 1 - O reconhecimento dos estágios do processo de morte e morrer pela equipe multiprofissional é essencial para a compreensão das necessidades humanas e para a adoção de cuidados integrais, éticos e humanizados. Considerando esse processo, suponha que os pais de uma criança de 7 anos de idade, hospitalizada com câncer em fase terminal, tenham recebido os resultados dos exames realizados após o tratamento, sendo comunicados pelo pediatra que a terapêutica não foi eficaz e que há curta expectativa de vida. De acordo com a teoria de Elisabeth Kübler-Ross (2008), assinale a opção **CORRETA** que apresenta os estágios do processo de morte e morrer que podem ser enfrentados pelos pais do caso acima.

A) Tristeza, depressão, luto, aceitação e morte.
B) Tristeza, raiva, barganha, depressão e aceitação.
C) Negação, tristeza, raiva, barganha e depressão.
D) Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.

QUESTÃO 2 - As Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) propõem a organização de serviços de saúde de maneira a priorizar a regionalização e ampliar o acesso. A Atenção Primária à Saúde (APS) é coordenadora dessas redes, voltando-se para uma população adscrita, propondo sua participação na governança da Rede e corresponsabilizando o sujeito pela própria saúde, aproximando-o das noções de participação popular e controle social. Considerando o papel do controle social nas de RAS, assinale a opção **CORRETA**:

A) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação dos serviços que compõem as RAS, na pactuação destes serviços na região de saúde e na gestão do cuidado.
B) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos nas ações que envolvem o cuidado direto dos indivíduos, considerando sua autonomia e protagonismo no processo de assistência.
C) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação da APS que coordena e orienta as RAS.
D) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação da APS durante o ano e na realização da Conferência de Saúde.

QUESTÃO 3 - O suicídio é um problema de saúde pública e sua complexidade envolve fatores de risco e fatores de proteção. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para o suicídio são: transtornos mentais, como esquizofrenia e transtornos de humor; uso problemático de álcool e outras drogas; tentativas prévias de suicídio; doenças orgânicas crônicas e com estigma social; e fatores sociodemográficos e ambientais. A avaliação do risco de suicídio segue os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2009) e envolve a estratificação em risco baixo, médio e alto. Além do profissional de enfermagem, outros profissionais de saúde também devem realizar essa avaliação nos diferentes níveis de atenção à saúde, o que é determinante para reduzir os índices de morte autoprovocada. Considerando a avaliação do risco de suicídio, avalie as afirmações a seguir.

I. É indispensável que o Estado institua políticas públicas que promovam apoio psicossocial voltado às especificidades de pessoas do gênero feminino, pois as mulheres morrem mais do que homens por suicídio.
II. Situações/sintomas como perda recente do emprego, anedonia, humor deprimido e isolamento social, sem pensamento de morte, mas com tentativa prévia de suicídio, são consideradas, na avaliação do risco de suicídio, como médio risco.
III. Determinadas características pessoais (etnia, idade, sexo) e aspectos biográficos (emprego e renda, escolaridade, vivência recente de morte de entes queridos) podem representar fatores de risco para o comportamento suicida.
IV. Em uma tentativa de suicídio por ingesta de medicamentos, a equipe de enfermagem deve: chamar/contatar familiar ou outra pessoa que possa monitorar e oferecer apoio ao indivíduo; propor medidas que previnam novas tentativas de suicídio; pactuar encaminhamento para acompanhamento; e certificar-se de que a notificação obrigatória foi realizada.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.

QUESTÃO 4 - A tecnologia pode ser classificada tanto como um saber quanto por seus desdobramentos materiais e não materiais na produção dos serviços de saúde. As práticas do trabalho devem incluir as diversas tecnologias em adequação às necessidades de saúde, que são as ações e os serviços dos quais as pessoas precisam para ter melhores condições de vida. As tecnologias materiais podem ser classificadas como leves, leve-duras e duras. As tecnologias leves não são tangíveis, as duras são tangíveis e as leve-duras são um misto dessas duas. Todas tratam a tecnologia de forma abrangente, mediante análise de todo o processo produtivo até o produto final. Quanto ao uso de tecnologias no processo de trabalho do enfermeiro, avalie as afirmações a seguir.

I. As tecnologias duras englobam os recursos materiais utilizados no ato do cuidado em saúde.
II. O pensamento crítico é um instrumento de tecnologia dura, o qual subsidia a prática do enfermeiro na utilização do processo de enfermagem.
III. As tecnologias leves integram o ato de cuidar em si, estando relacionadas às diferentes formas de interação com a pessoa.
IV. A humanização do atendimento, como tecnologia leve, é uma forma de gerenciamento do trabalho nas relações interpessoais.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.

QUESTÃO 5 - Um jovem, que durante os últimos três anos de sua vida, trabalhou em uma empresa de fruticultura situada no Ceará, desenvolveu uma doença hepática que o levou a óbito aos 31 anos de idade. O laudo emitido por pesquisadores de uma faculdade apontou para hepatopatia grave de provável etiologia induzida por substâncias tóxicas (agrotóxicos) como a causa *mortis*. A tarefa do trabalhador consistia em atender às requisições de fertilizantes e agrotóxicos. Ele separava os produtos de acordo com a especificação e a quantidade indicadas na guia, para repassá-los ao setor de mistura. Os produtos manipulados apresentavam-se nas formas líquida, gasosa ou em pó. Os líquidos eram retirados de bombonas equipadas com torneiras; os sólidos eram pesados; e o gás estava armazenado em cilindros que eram atrelados em trator. Suas tarefas também envolviam guardar no estoque o restante do produto cuja embalagem foi aberta e não totalmente utilizada, assim como receber devolução de produtos liberados e não utilizados. O exercício de sua tarefa exigia o trânsito através do galpão, passando inclusive pelo setor de mistura, onde a contaminação do ar era maior. Considerando o caso apresentado e as atribuições da vigilância em saúde ambiental, avalie as afirmações a seguir.

I. A saúde ambiental estuda conflitos ecológicos distributivos e lança luz sobre as desigualdades e injustiças ambientais produzidas por assimetrias de poder entre os agentes econômicos e os povos afetados pela expansão agrícola, pelas mineradoras e por obras de infraestrutura em seus espaços de vida e reprodução social.
II. A anamnese e o exame físico de paciente com diagnóstico de hepatite tóxica ocupacional revelam dano hepático após a exposição ao agente químico e icterícia.
III. O risco à saúde por exposição a agrotóxicos no espaço de trabalho e de moradia consiste em situação denominada de injustiça ambiental.
IV. A área responsável pelos procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados à exposição de populações vulneráveis a agrotóxicos é a vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes físicos.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

A) I e IV.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.

QUESTÃO 6 - Sobre a teoria de solução de problemas de Faye Abdellah, podemos afirmar que:

A) Trabalha com enfoque em caracteres ambientais gerais como: iluminação, ruído, higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente externo, utensílios do paciente e aspecto nutricional.
B) Associa o estado de saúde do cliente aos fatores ambientais, percebidos por meio da observação e coleta de dados.
C) Define a enfermagem como auxílio ao individuo, doente ou sadio, na realização de atividades que contribuam para a saúde, recuperação, ou morte pacífica e tranquila.
D) Consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si mesmos, quando existe incapacidade, entre o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar.

QUESTÃO 7 - O Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Sobre a doença, analise as afirmativas abaixo:

I. As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
II. O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é bem mais frequente em adultos, mas pode ser diagnosticado na infância e na adolescência, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada “latent autoimmune diabetes in adults” (LADA).
III. Os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) apresentam os sintomas clássicos de hiperglicemia (poliuria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado) mais exacerbados do que os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1. A cetoacidose é a manifestação clássica inicial do DM2.
IV. A gestação consiste em condição diabetogênica, uma vez que a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina, com consequente aumento compensatório na produção de insulina e na resistência à insulina, podendo evoluir com disfunção das células β.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I e IV.

QUESTÃO 8 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988).

( ) A Lei nº 8.142, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990).

( ) A Lei nº 8.080 estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 1990).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – F.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) F – V – F.

QUESTÃO 9 - Como parte das estratégias para prevenção de infecção do trato urinário, a ANVISA recomenda.

A) Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano.
B) Trocar os cateteres de demora rotineiramente.
C) Utilizar habitualmente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
D) Realizar irrigação com sistema fechado quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas.

QUESTÃO 10 - Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

I. O profissional de enfermagem que falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos está sujeito à pena de cassação.
II. É um dever do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
III. Está entre os direitos dos profissionais de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

QUESTÃO 11 - Ao realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto, o enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da sonda com cerca de 20 ml de água destilada. Esse procedimento é realizado com o objetivo de:

A) Evitar a proliferação de bactérias.
B) Manter a pressão vesical constante.
C) "Ancorar" a sonda na bexiga.
D) Promover a lavagem vesical gradual.

QUESTÃO 12 - Sobre a propedêutica dos rins e da bexiga. A bexiga é um orgão muscular, sendo um reservatório com a capacidade para armazenar 400 a 500 mL de urina no adulto. Sobre isto, analise as afirmativas abaixo:

I. A propedêutica de entrevistas, inspeção, percussão, palpação e ausculta (na identificação de sopros abdominais, ou sons de murmurantes de baixa intensidade.
II. Sobre a palpação o Método de Devoto é realizado pelo enfermeiro em decúbito dorsal e com os joelhos levemente fletidos. E o Método de Israel: o paciente é posicionado em decúbito lateral, oposto ao lado do rim que será palpado.
III. A propedêutica de inspeção, percussão, palpação, ausculta.
IV. A propedêutica de inspeção, percussão, palpação, ausculta e entrevista.
V. A propedêutica é de: percussão, palpação, ausculta e entrevista.

Assinale a alternativa **CORRETA:**

A) As afirmativas I, II e III corretas
B) As afirmativas I, e II corretas
C) As afirmativas VI e V corretas
D) As afirmativas V, II, e III corretas

QUESTÃO 13 - Paciente de 65 anos, internado na UTI com diagnóstico de pancreatite aguda grave. Devido à sua condição, desenvolveu complicações gastrointestinais significativas, incluindo íleo paralítico por laparotomia exploradora congelada, o que impossibilitou a alimentação enteral. A equipe médica, após uma avaliação multidisciplinar, decidiu iniciar a Nutrição Parenteral Total (NPT) por meio de um cateter venoso central, para garantir a administração adequada de nutrientes essenciais e evitar a desnutrição, e perda muscular ponderal durante o processo de internação hospitalar. Refletindo sobre os dias de tratamento e o uso prolongado da NPT, assinale a opção que indica o cateter a ser utilizado para a punção venosa central indicada a este tratamento:

A) Cateter de Hickman-Broviac.
B) Cateter de Swan-Ganz.
C) Cateter duplo J.
D) Cateter de Sengstaken-Blakemore.

QUESTÃO 14 - Foi prescrito ao paciente F.R.T 55mg de hidrocortisona. A farmácia disponibilizou frasco de 100mg e de 500mg com diluente de 2 ml. Você irá administrar quantos ml do medicamento do frasco de 100mg e do frasco de 500mg, respectivamente?

A) 1,1 e 0,2
B) 0,2 e 1,1
C) 1,2 e 0,2
D) 1,1 e 0,1

QUESTÃO 15 - A doença de Parkinson está associada a níveis diminuídos de dopamina, em consequência da destruição das células neurais pigmentadas na substância nigra, localizada na região dos núcleos da base do encéfalo. A perda das reservas de dopamina nessa área do encéfalo resulta em mais neurotransmissores excitatórios que inibitórios, levando a desequilíbrio que afeta o movimento voluntário. A degeneração celular causa comprometimento dos tratos extrapiramidais que controlam as funções semiautomáticas e os movimentos coordenados. Nesse, sobre as **manifestações clínicas** é **CORRETO** afirmar:

A) A depressão do idoso e irritabilidade.
B) Amnésia e sonolência.
C) Demência, disfagia e afasia
D) Tremores em repouso, marcha arrastada e perda do equilíbrio.

QUESTÃO 16 - O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (Coren), são entidades autônomas de interesse público O COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. De acordo com o código do exercício profissional de Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro **EXCETO**:

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
C) Prescrição da assistência de enfermagem.
D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

QUESTÃO 17 - O processo de enfermagem é uma ferramenta sistematizada inerente do enfermeiro. Ao avaliar Joana de 65 anos, cosmopolita, residente da capital, enfermeira aposentada, sem comorbidades, na enfermaria do Hospital da UEA, você evidencia que Joana possui dificuldades na realização ao **autocuidado**, e apresenta-se em regular estado geral e higiene bucal insatisfatória. Nesse contexto é **CORRETO** afirmar que seu plano de cuidados estará direcionado a:

A) Teoria das NHB, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios endócrinos e motores.
B) Teoria de Orem, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios motores.
C) Teoria da Transculturalidade, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios motores e aos aspectos culturais do banho.
D) Teoria da Adaptação de Calista Roy, DE enfrentamento ineficaz relacionado com a depressão e a disfunção devido à evolução da doença.

QUESTÃO 18 – José, agricultor em Anori, interior do Amazonas, foi admitido em sua unidade com os sintomas: de dificuldade de deambular, tremores, fala arrastada, lentidão mental e confusão. É plausível iniciar as intervenções de enfermagem na mobilidade:

A) Aumentar o consumo de líquidos.
B) Avaliar e encaminhar para o acompanhamento de um terapeuta.
C) Ajudá-lo a planejar um programa de exercícios diários para aumentar a força muscular, coordenação e destreza.
D) Avaliar e encaminha a fonoaudiologia com exercícios na fala e lentidão mental.

QUESTÃO 19 - Você é o enfermeiro plantonista da unidade, ao realizar a visita na enfermaria clínica do Hospital do Amor, você avalia o sr. Antônio, de 55 anos, auxiliar de obra, casado, com diagnóstico de DM há dez anos, e com queixa principal de poliúria, prurido na região íntima e formigamento em membros inferiores. Após sua avaliação e intervenções no tratamento do DM tipo 2. Você informa que sr. Antônio receberá alta. Neste cenário, qual teoria de enfermagem sustentará seu plano de cuidados domiciliar?

A) Teoria do alcance de metas de King, com o foco na hiperglicemia.
B) Teoria de Adaptação Calista Roy, no processo adaptativo da doença.
C) Teoria do Autocuidado, promovendo as orientações no controle glicêmico, hídrico e autocuidado rigoroso com os MMSS.
D) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, orientando sobre a ingesta hídrica diária e controle glicêmico.

QUESTÃO 20 - Dentre as principais complicações crônicas do DM tipo 2 estão:

I. Neuropatia diabética, periodontia, retinopatia e glaucoma.
II. Doenças cardiovasculares, nefropatias.
III. Doenças congênitas pelo uso de insulinoterapia.
IV. Estabilidade glicêmica, após a oitava década.

Assinale alternativa **CORRETA**:

A) As afirmativas I e IV estão corretas.
B) As afirmativas I e II estão corretas.
C) As afirmativas III e IV estão corretas.
D) As afirmativas I, II, IV estão corretas.

QUESTÃO 21 - Em relação à anestesia raquidiana e peridural, qual das afirmativas é **CORRETA**?

A) Ambas são administradas no espaço subaracnóideo.
B) A anestesia raquidiana é indicada para procedimentos longos, pois permite controle contínuo da analgesia.
C) A anestesia peridural pode ser administrada de forma contínua, enquanto a raquidiana é geralmente administrada em dose única.
D) Ambas são utilizadas para cirurgias torácicas devido à ausência de interferência respiratória.

QUESTÃO 22 - Qual complicação pós-operatória imediata está associada ao uso de succinilcolina?

A) Atelectasia pulmonar.
B) Hipertermia maligna.
C) Depressão do reflexo de tosse.
D) Hipotermia acidental.

QUESTÃO 23 - Qual das seguintes complicações pós-operatórias está associada ao uso excessivo de oxigênio em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)?

A) Pneumotórax espontâneo.
B) Hipercapnia e acidose respiratória.
C) Atelectasia pulmonar.
D) Broncoespasmo grave.

QUESTÃO 24 - Na anestesia peridural, qual dos seguintes fatores contribui para um bloqueio mais extenso?

A) Volume maior de anestésico local.
B) Administração única de pequena dose no espaço subaracnóideo.
C) Uso de anestésicos voláteis como isoflurano.
D) Aplicação em nível torácico baixo.

QUESTÃO 25 - O enfermeiro da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) recebe um paciente de 63 anos, hipertenso e com sobrepeso, submetido a uma herniorrafia inguinal sob anestesia raquidiana. Durante a admissão na SRPA, o paciente apresenta náuseas, prurido difuso e pressão arterial de 85/50 mmHg. O enfermeiro revisa o prontuário e verifica que o paciente recebeu morfina peridural para analgesia intraoperatória. Após 15 minutos de monitorização, o paciente relata sensação de tontura e sudorese fria, mantendo PA 85/48 mmHg, frequência cardíaca 56 bpm e SpO_2 96% em ar ambiente. Com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), qual a conduta **PRIORITÁRIA** do enfermeiro?

A) Manter o paciente em decúbito dorsal, elevar os membros inferiores, administrar fluidos conforme prescrição e monitorar sinais vitais, estando atento a possíveis sinais de depressão respiratória.
B) Posicionar o paciente em Trendelemburg para aumentar a perfusão cerebral e administrar anti-hipertensivos.
C) Aplicar bolsa térmica para aliviar o prurido e incentivar a deambulação precoce para melhorar a pressão arterial.
D) Encaminhar o paciente para a enfermaria, pois os sintomas são esperados após anestesia regional.

QUESTÃO 26 - As infecções de sítio cirúrgico (ISC) são consideradas eventos adversos decorrentes do ato cirúrgico e que podem trazer alterações anatomofisiológicas provisórias e/ou permanentes, danos psicológicos, aumentos de custos para o paciente e para as instituições de saúde. Como forma de medidas de prevenção, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) aponta as medidas que deverão ser adotadas pelos profissionais e instituições de saúde. Sobre tais medidas relacionados ao indivíduo que será operado, marque a alternativa **INCORRETA**:

A) Tricotomia deve ser realizada somente quando necessário para facilitar a área que será visualizada e utilizar tricotomizadores elétricos.
B) Manter o controle glicêmico no pré e pós-operatório imediato abaixo de 180 mg/dl.
C) Manter a hipotermia para evitar proliferação microbiana.
D) Utilizar protetores plásticos de feridas para cirurgias do trato gastrintestinais e biliares.

QUESTÃO 27 - O enfermeiro do setor cirúrgico de um determinado hospital, está orientando sua equipe para a realização dos curativos das lesões operatórias, baseado nas referências ministeriais (Brasil, 2017) e de Hinkle et al. (2023). Tendo em vista a classificação do grau de contaminação das cirurgias realizadas, qual seria a melhor sequência de acordo com estas referências?

A) Craniotomia sem inserção de dreno, cistostomia, colostomia e desbridamento cirúrgico de lesão por pressão (LPP).
B) Cistostomia, craniotomia sem inserção de dreno, colostomia e desbridamento cirúrgico de lesão por pressão (LPP).
C) Cistostomia, colostomia, desbridamento cirúrgico de lesão por pressão (LPP) e craniotomia sem inserção de dreno.
D) Craniotomia sem inserção de dreno, desbridamento cirúrgico de lesão por pressão (LPP), cistostomia e colostomia.

QUESTÃO 28 - Para Hinkle et al. (2023), compreender os tipos de cicatrização é importante para o melhor manejo da lesão operatória e para a escolha da cobertura ideal. Leia o caso abaixo:

> "Sr. P.C.V, 52 anos, adentrou o setor de urgência de um hospital universitário, de forma espontânea, trazido por seus familiares. Durante a entrevista, relata dor intensa e inchaço na região da bolsa escrotal e temperatura de 38°C há pelo menos 48 horas. À ectoscopia, apresenta-se com fáceis de dor intensa, palidez cutânea, extremidades frias e sudoreicas. Na região perineal, edema e rubor acentuados. Na avaliação dos exames laboratoriais, o leucograma estava 27.000 mm^3. Após o preparo, foi encaminhado ao centro cirúrgico e submetido a um desbridamento cirúrgico da região perianal, devido ao diagnóstico de síndrome de Fournier. Foi admitido no setor de internação com cateter venoso, cateter vesical de demora e curativo oclusivo na região citada. No dia seguinte, ao abrir o curativo o enfermeiro avaliou a lesão que apresentava: lesão aberta e profunda, bordas irregulares e aderidas, elevada exsudação purulenta, região perilesional íntegra."

Considerando o caso acima, assinale a alternativa **CORRETA:**

A) Trata-se de uma lesão com cicatrização por primeira intenção. O ideal é que a cobertura seja úmida (primária) e depois ocluída com curativo seco estéril (secundária).
B) Trata-se de uma lesão com cicatrização por segunda intenção. O ideal é que a cobertura seja úmida (primária) e depois ocluída com curativo seco estéril (secundária).
C) Trata-se de uma lesão com cicatrização por terceira intenção. O ideal é que a cobertura seja úmida (primária) e depois ocluída com curativo seco estéril (secundária).

D) Trata-se de uma lesão com cicatrização por terceira intenção. O ideal é que a cobertura seja seca (primária) e depois ocluída com curativo seco estéril (secundária).

QUESTÃO 29 - A sra. K.L.P, 70 anos, foi submetida a laparotomia exploratória, devido a obstrução total da luz intestinal. Possui como comorbidades obesidade e diabete mellitus (DM). No 7° DPO apresentou exsudação purulenta pela lesão cirúrgica e distensão abdominal importante. Após uma tosse vigorosa teve uma evisceração. Quais as condutas deverão ser seguidas:

A) Colocar em semi-fowler, puncionar acesso calibroso caso necessário, calçar luvas estéreis e reposicionar as alças intestinais. O cirurgião deve ser notificado imediatamente e após encaminhá-la para o centro cirúrgico.
B) Colocar em decúbito lateral, puncionar acesso calibroso caso necessário, notificar o cirurgião e encaminhar ao centro cirúrgico imediatamente.
C) Colocar em decúbito lateral, reposicionar as alças intestinais, notificar o cirurgião e encaminhar ao centro cirúrgico imediatamente.
D) Colocar em semi-fowler, puncionar acesso calibroso caso necessário, cobrir as vísceras com gazes ou abdominais estéreis e úmidos. O cirurgião deve ser notificado imediatamente e após encaminhá-la para o centro cirúrgico.

QUESTÃO 30 - Dentre os cuidados com as lesões operatórias estão o manuseio correto dos drenos, que são dispositivos inseridos na parte peri-incisional para eliminar líquidos que podem servir como meio de cultura. Leia as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:

A) Os curativos no local da inserção do dreno, incluem a limpeza e oclusão com gaze estéril e esparadrapo. Deve-se atentar para que a gaze e o esparadrapo não obstruam a descida do líquido para a bolsa coletora.
B) Os curativos no local da inserção do dreno podem ser realizados com luvas de procedimento, visto que é considerado potencialmente contaminado. Deve-se atentar para que a gaze e o esparadrapo não obstruam a descida do líquido para a bolsa coletora.
C) Os locais de inserção do dreno podem ser mantidos sem oclusão após 24 horas da inserção. Contudo, deve-se realizar a limpeza da região onde está inserido.
D) Os curativos devem ser realizados com coberta de óleos graxos essenciais no local de inserção do dreno e só deverão ser trocados a cada 72 horas. Deve-se atentar para que a gaze e o esparadrapo não obstruam a descida do líquido para a bolsa coletora.

QUESTÃO 31 - Na unidade de internação cirúrgica de um hospital de médio porte, uma enfermeira recepcionou dois novos técnicos de enfermagem. Como protocolo do hospital, ela deve fazer o acolhimento desses profissionais e ambientá-los, bem como realizar o treinamento das normas e rotinas da unidade. A enfermeira discute e apresenta o protocolo acerca dos tipos de materiais, da guarda temporária e do encaminhamento à Central de Materiais e Esterilização (CME). Considerando a situação apresentada e os múltiplos aspectos que ela suscita, avalie as afirmações a seguir.

I. Os produtos para saúde críticos são aqueles utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, como, por exemplo, pinças para curativo; campos estéreis; macro e micronebulizadores para oxigenoterapia.
II. O armazenamento de produtos esterilizados deve ser realizado em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta, e submetidos a manipulação mínima.
III. A equipe de enfermagem deve verificar se o rótulo de identificação das embalagens apresenta as seguintes informações: nome do produto; número do lote; data da esterilização; data limite de uso; método de esterilização; e nome do responsável pelo preparo.
IV. O transporte de material esterilizado na CME deve ser realizado em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade das embalagens.
V. Os produtos infectados devem ser transportados de uma unidade para a CME em saco plástico branco leitoso identificado como “material infectante”, contendo a lista de produtos a serem processados e o nome do serviço solicitante.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) I, IV e V.
D) II, III e IV.

QUESTÃO 32 - Uma mulher de 70 anos de idade deu entrada na unidade de internação cirúrgica há 3 dias após ter sido submetida a laparotomia exploratória emergencial, com incisão cirúrgica realizada na região abdominal mediana. Devido ao processo de internação, a paciente está em repouso no leito desde o procedimento cirúrgico, em uso de cateter enteral, cateter vesical de demora e cateter venoso central. A ferida operatória apresenta sinais flogísticos e drenagem purulenta em média quantidade em curativo secundário. Durante o exame físico, a enfermeira identificou edema e calor no membro inferior direito, alertando a equipe médica para um possível diagnóstico de trombose venosa profunda (TVP). Em relação aos três fatores de risco para TVP, assinale a opção **CORRETA:**

A) Procedimento cirúrgico; cateter vesical de demora; cateter enteral.
B) Cateter vesical de demora; procedimento cirúrgico; repouso no leito.
C) Repouso no leito; cateter enteral; sinais flogísticos da ferida operatória.
D) Processo cirúrgico; cateter venoso central; repouso no leito.

QUESTÃO 33 - Uma senhora de 45 anos de idade foi admitida em uma unidade cirúrgica para realização de apendicectomia. O enfermeiro do centro cirúrgico realizou a visita pré-operatória para identificar e avaliar a paciente e preencheu o instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). No que se refere à aplicação da SAEP e do protocolo de cirurgia segura, assinale a opção **CORRETA**:

A) Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da paciente e do acompanhante sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e comunicação à enfermeira da unidade cirúrgica em caso de temperatura axilar maior que 38 °C.
B) Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a orientação da paciente e do acompanhante sobre o procedimento cirúrgico, punção de acesso venoso calibroso e administração de antimicrobiano profilático.
C) Os cuidados de enfermagem no pré-operatório envolvem a comunicação à enfermeira da unidade cirúrgica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e administração de antimicrobiano e antitérmico profiláticos.
D) Os cuidados de enfermagem no transoperatório envolvem a comunicação à enfermeira da unidade cirúrgica sobre dor, punção de acesso venoso calibroso e em caso de temperatura axilar maior que 38 °C.

QUESTÃO 34 - A adaptação à mudança de hábitos intestinais e os novos cuidados de higiene são dificuldades a serem enfrentadas pelos pacientes submetidos à colostomia. Após o procedimento cirúrgico, o acompanhamento e o incentivo do enfermeiro são imprescindíveis para que o paciente e sua família aceitem a nova realidade e recebam as orientações necessárias às práticas relacionadas ao autocuidado. Considerando os cuidados necessários à promoção da saúde do paciente submetido a esse procedimento cirúrgico, avalie as afirmações a seguir.

I. É necessário observar rotineiramente o estoma, no que se refere a cor, brilho, umidade, tamanho, forma, localização, tipo e drenagem, e cuidar das condições da pele perilesional.
II. O enfermeiro deve verificar o tipo de bolsa mais adequado ao caso e mostrar interesse em ajudar o paciente e seus familiares, por meio do esclarecimento de dúvidas e orientação quanto aos procedimentos com a ostomia, de acordo com a evolução do paciente.
III. O medo de sangramento e dor podem causar sentimentos negativos no paciente, por isso o enfermeiro deve manusear a bolsa de colostomia nos primeiros momentos.

IV. As bolsas de colostomia adequadas apresentam diâmetro correspondente ao estoma para que não ocorram compressão e necrose do local, evitando-se, assim, trocas e risco de lesão na pele.

V. A segurança e a intimidade do paciente devem ser preservadas, e a sua autonomia estimulada, evitando-se que os familiares participem das primeiras trocas de bolsa.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em

A) II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e V.
D) III, IV e V.

QUESTÃO 35 - O posicionamento cirúrgico inadequado pode levar a complicações. Um dos riscos associados é:

A) Melhora da perfusão tecidual.
B) Prevenção de úlceras de pressão.
C) Lesão de nervos periféricos.
D) Aumento da mobilidade articular.

QUESTÃO 36 - Sobre os cuidados de enfermagem nas cirurgias, analise as afirmativas abaixo e jugue em verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) As orientações pré-operatórias e os cuidados da equipe de enfermagem minimizam a ocorrência de problemas antes do procedimento cirúrgico e que podem acarretar complicações durante e após a cirurgia.

( ) As cirurgias cardíacas são compreendidas como procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, que exigem observação contínua da equipe de enfermagem e a prestação de cuidados que visam minimizar possíveis complicações, como alterações dos níveis pressóricos, arritmias e isquemias.

( ) As cirurgias torácicas exigem cuidados específicos no pós-operatório tais como: mobilização precoce, fisioterapia motora e respiratória. A equipe de enfermagem contribui realizando esforços para mobilidade precoce, como sentar-se fora do leito e caminhar pela unidade de internação independente da condição clínica do paciente.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

A) V – V - V.
B) V - F - F.
C) V – V - F.
D) F - V - F

QUESTÃO 37 - A Enfermeira Dafne está fazendo a ambientação dos técnicos de enfermagem no Centro de Material e Esterilização (CME), esclarecendo sobre as atividades a serem desenvolvidas e explicou que a desinfecção é um procedimento classificada em níveis de atuação, conforme o espectro de ação contra os microrganismos, em alto, médio e baixo nível, especificando os produtos utilizados e as suas ações. Em relação aos métodos de **desinfecção de alto nível,** qual das seguintes afirmações está **CORRETA**?

A) O Álcool 70% é um desinfetante de alto nível eficaz contra todos os tipos de microrganismos, incluindo os esporos bacterianos.
B) O Glutaraldeído é um desinfetante de alto nível que pode ser utilizado para esterilizar artigos semicríticos, como endoscópios, por imersão prolongada.
C) O Peróxido de Hidrogênio é um desinfetante de alto nível que possui ação lenta e é considerado um agente insalubre para o meio ambiente e para os profissionais de saúde.
D) O Ácido Peracético é um desinfetante de alto nível, de baixa toxicidade, eficaz contra os microrganismos, utilizado em produtos para a saúde (PPS) semicríticos, inclusos os de assistência respiratória.

QUESTÃO 38 - O Centro de Material e Esterilização é responsável pelo reprocessamento de produtos para a saúde, sendo o fluxo unidirecional, realizando desde a recepção desses produtos até a sua distribuição para os setores, conforme a necessidade de cada um. Durante o processo de limpeza de produtos para a saúde (PPS), o principal objetivo da utilização de água com detergente enzimático é:

A) Remover a sujidade mais aderida e as proteínas presentes nos produtos para a saúde, facilitando a ação dos desinfetantes e esterilizantes.
B) Promover a desinfecção de alto nível dos artigos, eliminando as bactérias e vírus mais resistentes.
C) Reduzir a carga microbiana presente nos produtos para a saúde (PPS), diminuindo o risco de infecção durante os procedimentos.
D) Garantir a esterilização dos produtos para a saúde (PPS), eliminando todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos.

QUESTÃO 39 - Na escolha do método de esterilização são levados em consideração vários aspectos, tais como produto, embalagem, além da validação dos equipamentos e produtos através de indicadores. Diante disso, qual o principal fator que influencia a **eficácia** do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclave)?

A) A temperatura, o tempo de exposição e a pressão do vapor.
B) A concentração do agente esterilizante utilizado.
C) O tipo de material do artigo a ser esterilizado.
D) O nível de sujidade presente no artigo.

QUESTÃO 40 - No preparo do produto para a saúde o Enfermeiro e equipe devem ter conhecimento sobre os equipamentos e insumos utilizados no cotidiano das atividades do setor. Considerando a variedade de Sistemas de Barreira Estéril disponíveis e a necessidade de compatibilizá-los com os diferentes métodos de esterilização, o Sistema de Barreira Estéril **indicado** para esterilização por **Peróxido de Hidrogênio** é:

A) Caixa inox.
B) Contêiner rígido em inox.
C) Algodão cru.
D) Embalagem confeccionadas com Tyvek®.

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS